

1. A amostra pode ser obtida de qualquer evacuação.
2. Para a obtenção da amostra, colete as fezes inicialmente em um recipiente limpo e seco. Evite contato da amostra com urina ou água do vaso sanitário.
3. Em seguida, com auxílio da espátula, transfira pequena porção, correspondente a aproximadamente 1 colher de chá (ou 5 ml, caso as fezes sejam líquidas), para o frasco de tampa branca fornecido pelo Laboratório.
4. Evite contaminar a parte externa do frasco com fezes, tampe bem o frasco.
5. Sangue, muco, pus, eventualmente presentes, devem ser incluídos na amostra para exame.
6. Parasitas ou vermes visíveis eventualmente presentes, devem ser separados em outro recipiente.
7. Guarde a amostra coletada em refrigerador (não a congele) até que seja levada ao laboratório no máximo em 12 horas após a coleta.
8. Certas substâncias e medicações podem interferir no resultado do exame: óleo mineral, bário (contraste radiológico), medicações com bismuto, antibióticos, anti-diarréicos não-absorvíveis. Nessas eventualidades, aguarde 2 semanas antes de coletar a amostra.
9. Laxantes são contra-indicados para obtenção da amostra, exceto laxante salino (sulfato de sódio), que deve ser administrado a critério do médico clínico.
10. Quando solicitado 3 amostras, coletar em dias alternados (2^a, 4^a e 6^a feira, por exemplo). Seguir os mesmos cuidados citados acima. Utilizar um frasco para cada coleta, anotando dia e hora da realização das mesmas. Guarde-as em refrigerador (não congelar). As amostras devem ser levadas ao Laboratório no máximo 12 horas após a coleta.