

Agendamento: DATA: ____/____/____ HORÁRIO: ____:____

Obs: Apesar do seu horário estar agendado, as urgências terão atendimento imediato.

- Aparelho urinário (rins, bexiga e próstata via abdominal)
Tomar de 4 a 6 copos de água, 1 hora antes da realização do exame e manter a bexiga cheia.
- Aparelho urinário com Doppler
Adultos: Jejum de 6 horas. No dia anterior, tomar 1 comprimido ou 40 gotas de Luftal, após o almoço e após o jantar.
Crianças : Jejum de 6 horas. Não administrar Luftal.
- Pélvico via Transabdominal simples ou com Doppler e Obstétrico Transabdominal (até 12 semanas)
Tomar de 4 a 6 copos de água, 1 hora antes da realização do exame e manter a bexiga cheia.
- Pélvico pela via Transvaginal
Bexiga vazia. Obrigatório acompanhante maior de idade, para pacientes menores de 18 anos.
- Abdome superior (fígado, vias biliares, vesículas e pâncreas) e Abdome total simples ou com Doppler
Adultos: Jejum de 6 horas.
Crianças: Lactantes – Suspender a mamada
0 a 5 anos – Jejum de 4 horas
6 a 12 anos – Jejum de 6 horas
- Aorto ilíacas e cava ilíacas
Adultos: Jejum de 6 horas. Tomar de 4 a 6 copos de água (somente água) uma hora antes do exame e manter a bexiga cheia.
Crianças: Lactantes – Suspender a mamada
0 a 5 anos – Jejum de 4 horas
6 a 12 anos – Jejum de 6 horas
- Obstétrico e morfológico
Trazer ultrassons anteriores e carteira de pré-natal.

Necessário pedido médico e resultados de exames realizados anteriormente
Necessário documento de identidade