

Guia de Orientações Cirurgia de Vesícula (Colecistectomia)

O que é a vesícula biliar?

Vesícula biliar é um pequeno órgão na parte superior do abdômen.


Sua função é coletar e armazenar um líquido chamado bile, que ajuda seu corpo a quebrar os alimentos.

O que causa problemas de vesícula biliar?

Os cálculos biliares são frequentemente a causa. Esses pequenos depósitos duros se formam na vesícula biliar, e podem entrar no ducto biliar, que conecta a vesícula biliar ao intestino.

Quais são os sintomas de problemas da vesícula biliar?

Dor abdominal, náuseas, vômitos, indigestão, febre e icterícia (pele e olhos amarelados).



Como tratar os problemas da vesícula biliar?

Você pode obter algum alívio comendo menos gordura, mas os cálculos raramente desaparecem por conta própria. Outros tratamentos para quebra dos cálculos biliares costumam não funcionar. Retirar a vesícula biliar geralmente é a melhor opção.

Quais são as vantagens da cirurgia laparoscópica da vesícula biliar?

Pequenas incisões, menos dor, recuperação mais rápida, alta no dia seguinte da cirurgia.

Como me preparar para cirurgia?

O médico realizará um exame físico completo e verificará a necessidade de outros exames para a realização da cirurgia. O médico conversará com você sobre os riscos e benefícios da cirurgia, e você assinará um termo de consentimento, dizendo que entende e concorda com a operação.


Orientações de preparo pré cirurgia:

Tomar banho na noite anterior á cirurgia. Não depilar a área da barriga, realizar jejum de oito horas antes da cirurgia. No dia da cirurgia tomar apenas os medicamentos liberados pelo seu médico, com apenas 2 dedos de água. Você pode precisar parar de tomar anticoagulantes, suplementos e medicamentos que afetam seu sistema imunológico, confira com o médico após agendar seu procedimento.

Como é feita a remoção laparoscópica da vesícula biliar?

Será realizada anestesia geral, Isso significa que você dormirá durante o processo. O cirurgião faz uma incisão, enche o abdômen com gás, criando espaço para fazer a operação. Em seguida, eles inserem uma pequena câmera pela abertura.

A câmera mostra a cirurgia em uma tela, para melhor visualização. Serão inseridos mais três instrumentos longos e estreitos e será removida suavemente sua vesícula através de uma das incisões.



E se eu não puder fazer a remoção laparoscópica da vesícula biliar?

Algumas pessoas não podem fazer a remoção laparoscópica da vesícula biliar e sua cirurgia pode mudar para aberta, se sua vesícula biliar tiver muitos danos, como cicatrizes ou inflamação, sobrepeso e sangramento durante a cirurgia. Se, for o caso seu médico mudará sua cirurgia para aberta, se a opção for a mais segura para você.

Quais são as possíveis complicações da remoção laparoscópica da vesícula biliar?

A maioria das pessoas que fazem a remoção laparoscópica da vesícula biliar tem poucas complicações, como: sangramento, infecção na área da cirurgia, hérnias (deslocamento de um órgão ou tecido através de uma abertura), coágulos sanguíneos e problemas cardíacos. A cirurgia da vesícula biliar pode ferir áreas próximas, como o ducto biliar comum, intestino grosso (cólon) ou o intestino delgado. Você pode precisar de outra cirurgia se isso acontecer. Também é possível que a bile vaze para o abdômen após a cirurgia da vesícula biliar. A maioria das complicações da cirurgia da vesícula biliar são raras.

O que devo esperar após a cirurgia de remoção da vesícula biliar (colecistectomia)?

Em casa:

Você provavelmente poderá ir para casa no dia seguinte da cirurgia, para isso precisa ser capaz de beber líquidos antes de ir para casa

Estarei com dor?

É comum você sentir alguma dor após a cirurgia nos locais da incisão, no abdômen e nos ombros. Isto é do ar colocado em seu abdômen durante a operação. A dor deve desaparecer em 24 a 48 horas, você pode tomar medicamentos conforme receita médica ou realizar compressa com gelo em suas incisões..

Você pode se sentir enjoado ou apresentar vômitos, esses sintomas são da anestesia e da cirurgia, você deve se sentir melhor em um ou dois dias.

Atividades

Você deve ser tão ativo quanto seu corpo permite, você deve caminhar, pode subir e descer escadas, dirigir após 24 horas após a anestesia. No dia seguinte, você pode tirar os curativos e tomar banho.

Você provavelmente pode voltar à atividade normal cerca de uma semana após a remoção laparoscópica da vesícula biliar.

Se você fez uma cirurgia aberta com uma grande incisão, precisará de mais tempo para se recuperar, precisará ficar no hospital por alguns dias após a cirurgia. Sua recuperação será mais lenta, espere voltar às atividades completas em 4 a 6 semanas.

Quando consultar seu médico após a cirurgia

Você precisa voltar ao hospital entre 2 a 3 semanas após a cirurgia.

Quando procurar atendimento médico de urgência após colecistectomia laparoscópica

Volte ao Pronto Socorro do Hospital Regional de Cotia se:

Febre acima de 38,5 °C, dor intensa ou inchaço na barriga, pele amarelada (icterícia), mal estar no estômago por mais de 48 horas, vômito e náuseas. Sangue ou pus vindo de qualquer um dos pequenos cortes na área da cirurgia, vermelhidão que se espalha e piora, dor que não passa com medicamentos prescritos, falta de ar ou tosse que não melhora.